

Welke uilen en roofvogels zijn dat?

De vogels zijn volgens de kleurcode onderverdeeld in de volgende groepen:

Uilen 10



Valken 30



Overige roofvogels 46



Extra:

Vliegsilhouet van de belangrijkste soorten 96-97





Uilen

- > veren wit, deels gestreept
- > kop groot
- > ogen geel

Sneeuwuil

Bubo scandiacus

Kenmerken Lengte 53-65 cm, spanwijdte 125-150 cm. Grote, onmiskenbare uilensoort met witte veren. Vrouwtjes en jongen hebben duidelijke donkere strepen in het gezicht, mannetjes alleen met vage of geen strepen. Ronde kop met gele ogen. **Voorkomen** Broedt in de toendra van Noord-Siberië, alleen in sommige jaren ook in Scandinavië. Afzonderlijke exemplaren van de soort bereiken bijna het hele jaar door Midden- en West-Europa. **Bijzonderheden** De sneeuwuil broedt in de open lucht op de grond, bij voorkeur op heuveltjes en tussen kleine rotsen. Hij verdedigt zijn nest zo fel tegen poolvossen, dat rotganzen zijn bescherming zoeken en zich in zijn nabijheid vestigen. Het legsel bestaat meestal uit zeven tot negen eieren. Als het aanbod aan lemmingen groot is, kunnen er meer eieren zijn, en als er weinig lemmingen zijn, neemt ook het legsel af. Dankzij grote vetvoorraden kunnen sneeuwuielen in de winter wekenlang zonder voedsel.





Valken

- > mannetje donkergrijs-rood
- > vrouwtje blauwgrijs-oranje
- > staart lang, vleugels smal

Roodpootvalk

Falco vespertinus

Kenmerken Lengte 28-34 cm, spanwijdte 65-76 cm. Met zijn lange staart en smalle vleugels lijkt hij op de torenvalk, maar hij is

iets minder slank. Mannetje (foto rechtsonder) donkergrijs, alleen pootveren en onderkant buik bruinrood. Bovenkant vrouwtje (foto rechtsboven) blauwgrijs met zwarte strepen, onderkant oranje met enkele donkere vlekken, ook achterhoofd oranje. Poten rood. Bovenkant jonge vogels bruin, onderkant licht met bruine strepen. **Voorkomen** Broedvogel in halfopen landschap in Oost- en Zuidoost-Europa, overwintert ten zuiden van de Sahara tot Zuid-Afrika. In veel jaren zijn wisselende aantallen van de soort in Midden-Europa te zien. **Bijzonderheden** Roodpootvalken broeden vaak in kolonies, waarbij ze vooral boomnesten van zwarte kraaien gebruiken. Ook jagen ze gezamenlijk op sprinkhanen, libelles, muizen en kikkers. Ze speuren graag vanaf een boom naar hun prooi, maar jagen ook biddend.





Overige roofvogels

- > enigszins gevorkte staart
- > bijna egaal donkerbruin
- > lichte band op bovenzvleugel

Zwarte wouw

Milvus migrans

Kenmerken Lengte 48-58 cm, spanwijdte 130-155 cm. Veren voornamelijk donkerbruin, alleen kop en buitenste ondervleugels zijn

lichter, bovendien lichtbruine band op de bovenzvleugel. Staart is iets gevorkt en kan bij cirkelende vlucht ook recht lijken.

Voorkomen Broedt in bossen en struiken in Zuid-, Midden- en Oost-Europa, overwintert ten zuiden van de Sahara in Afrika.

Bijzonderheden De zwarte wouw is een wijdverspreide vogelsoort die behalve in Europa bijna overal in Afrika, Azië en Australië leeft. Net als rode wouwen eten zwarte wouwen voornamelijk aas, dat ze op weiden en velden, maar ook op vuilnisbelten en aan de rand van wegen zoeken. Ze zijn ook vaak te zien bij rivieren en meren, waar ze speuren naar dode vissen. Buiten de broedtijd verzamelen zwarte wouwen zich 's avond op slaappleatsen. Van daaruit gaan ze ruim 30 km in de omtrek op zoek naar voedsel.



Vliegsilhouet van de belangrijkste soorten

Uilen



Kerkuil
(blz. 10)



Oehoe
(blz. 12)



Bosuil
(blz. 14)



Laplanduil
(blz. 16)



Oeraluil
(blz. 16)



Sperveruil
(blz. 18)



Velduil
(blz. 18)



Ransuil
(blz. 20)



Dwergooruil
(blz. 22)



Dwerguil
(blz. 22)



Ruigpootuil
(blz. 24)



Steenuil
(blz. 26)



Sneeuuil
(blz. 28)

Valken



Torenavalk
(blz. 30)



Boomvalk
(blz. 32)



Smelleken
(blz. 34)



Slechtvalk
(blz. 40)

Giervalk
(blz. 42)



Overige roofvogels



Lammergier
(blz. 46)



Vale gier
(blz. 48)



Zeearend
(blz. 52)



Visarend
(blz. 54)



Steenarend
(blz. 56)



Schreeuwarend
(blz. 60)



Bastaardarend
(blz. 62)



Havikarend
(blz. 66)



Slangenarend
(blz. 66)



Rode wouw
(blz. 68)



Zwarte wouw
(blz. 70)



Bruine kiekendief
(blz. 72)



Blauwe kiekendief
(blz. 74)



Grauwe kiekendief
(blz. 76)



Buizerd
(blz. 80)



Wespandief
(blz. 84)



Sperwer
(blz. 86)



Havik
(blz. 88)